



			
18 bis 35	einmalig	Hausarzt/ Internist	Check-up (Arztgespräch, körperliche Untersuchung, Blutdruck-Messung, ggf. Blutprobe, Beratung)
ab 18	halbjährlich	Zahnarzt	Zahnvorsorge-Untersuchungen
ab 20	jährlich	Gynäkologe	Genitaluntersuchung auf Gebärmutterhalskrebs (Arztgespräch, körperliche Untersuchung mit Abstrich für Pap-Test)
bis 25	jährlich	Gynäkologe	Chlamydien-Screening (Urintest)
ab 30	jährlich	Gynäkologe	Brustuntersuchung (Tastuntersuchung)
ab 35	alle 3 Jahre	Gynäkologe	Kombinierte Genitaluntersuchung mit Pap-Test und HPV-Test
ab 35	alle 3 Jahre einmalig	Hausarzt/ Internist	Check-up (Arztgespräch, körperliche Untersuchung, Blutdruck-Messung, Blutprobe, Urin-Untersuchung, Beratung) Screening auf Hepatitis B- und Hepatitis C-Virusinfektion
ab 35	alle 2 Jahre	Hausarzt/ Internist oder Hautarzt	Früherkennung Hautkrebs (Inspektion der gesamten Haut, Dokumentation)
50 bis 54	jährlich	Hausarzt/ Internist oder Gastroentero- loge (bei Darm- spiegelung)	Früherkennung Darmkrebs (Test auf Blut im Stuhl)
ab 55	alle 2 Jahre		Ab 55 wahlweise alle 2 Jahre Test auf Blut im Stuhl oder durch 2 Darmspiegelungen im Mindestabstand von zehn Jahren
50 bis 69*	alle 2 Jahre	Radiologe	Mammographie-Screening auf Brustkrebs (Röntgen)



			
18 bis 35	einmalig	Hausarzt/ Internist	Check-up (Arztgespräch, körperliche Untersuchung, Blutdruck-Messung, ggf. Blutprobe, Beratung)
ab 18	halbjährlich	Zahnarzt	Zahnvorsorge-Untersuchungen
ab 35	alle 3 Jahre einmalig	Hausarzt/ Internist	Check-up (Arztgespräch, körperliche Untersuchung, Blutdruck-Messung, Blutprobe, Urin-Untersuchung, Beratung) Screening auf Hepatitis B- und Hepatitis C-Virusinfektion
ab 35	alle 2 Jahre	Hausarzt/ Internist oder Hautarzt	Früherkennung Hautkrebs (Inspektion der gesamten Haut, Dokumentation)
ab 45	jährlich	Hausarzt/ Internist oder Urologe	Untersuchung der Prostata und der äußeren Genitalien (Tastuntersuchung)
ab 50	jährlich	Hausarzt/ Internist oder Gastroenterologe (bei Darm- spiegelung)	Früherkennung Darmkrebs wahlweise als jährlicher Test auf Blut im Stuhl oder durch 2 Darmspiegelungen im Mindestabstand von zehn Jahren
ab 65	einmalig	Hausarzt/Internist, Urologe, Chirurg, Radiologe	Früherkennung Bauchaorten- Aneurysma (Ultraschall)